

答はすべて解答用紙に記入せよ。

- 1 「改訂6版 救急蘇生法の指針2020 市民用・解説編（日本救急医療財団 心肺蘇生法委員会監修）」（以下「指針」と表記する。）に関する、次の各問に答えよ。

問1 次のア～オは、指針に示されている「ファーストエイド」について述べたものである。正しいものを○、誤っているものを×としたとき、その組合せとして正しいものを、下の①～⑤から一つ選び、番号で答えよ。

ア けがで手足が変形している場合、変形した状態を元に戻してから、添え木や三角巾などで固定する。

イ やけどの範囲が広い場合は、氷や氷水を用いて、全身の体温が下がるほどの冷却を行う。

ウ 高所から落ちて、頸椎を痛めている可能性がある場合、意識がはっきりしない傷病者に対しては、傷病者の頭を手でやさしく支え、首が大きく動かないようにし、意識のはっきりしている傷病者に対しては、頭を支える必要はない。

エ 抜けた歯を持つときには、歯の付け根の部分に触れないようにする。

オ 毒物を飲んだ場合は、できるだけ早く水や牛乳を飲ませたり、吐かせたりする。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	×	○	×
②	×	×	○	○	×
③	○	×	○	×	×
④	×	○	×	○	○
⑤	○	×	×	×	○

問2 次のア～オは、指針に示されている「心肺蘇生の手順」について述べたものである。正しいものを○、誤っているものを×としたとき、その組合せとして正しいものを、下の①～⑤から一つ選び、番号で答えよ。

ア 救助者は、傷病者を「反応なし」と判断した場合だけでなく、反応があるかないかの判断に迷う場合、またはわからない場合も心停止の可能性を考えて行動する。

イ 大声で叫んでも誰も来ない場合、すぐ近くにAEDがあることがわかっていれば、傷病者を離れてAEDを取りに行ってもよい。

ウ 胸骨圧迫の方法は、手のひら全体に力を加えて圧迫する。

エ 胸骨圧迫は、小児では胸の厚さの約1/2沈み込む程度に圧迫する。

オ 胸骨圧迫をほかに手伝ってくれる人がいる場合は、1～2分を目安に役割を交代する。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	×	○	○	×	○
②	○	×	○	○	×
③	×	×	○	○	○
④	○	○	×	×	○
⑤	○	○	×	○	×